

Estéril

APRESENTAÇÕES:

Frasco plástico conta-gotas contendo 10mL ou 15mL, ou 1,5 ml se amostra-grátis.

COMPOSIÇÃO:

Cada mL de SYSTANE® UL Lubrificante Oftálmico contém: hidroxipropil guar 8A, polietilenoglicol 400, ácido bórico, propilenoglicol, sorbitol, cloreto de sódio, cloreto de potássio, poliquatérmium-1, aminometilpropanol, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico e água purificada.

INDICAÇÕES E USO:

SYSTANE® UL Lubrificante Oftálmico é usado para alívio do desconforto ocular, ressecamento, irritação, ardor, sensação de areia e corpo estranho, provocados por fatores ambientais como poeira, fumaça, raios ultravioleta, calor seco (sauna), ar condicionado, vento, cosméticos, exposição prolongada a computadores e/ou aparelhos de televisão.

Uma recente inovação científica resultou no desenvolvimento do novo lubrificante ocular (SYSTANE® UL Lubrificante Oftálmico), o qual combina os benefícios comprovados do HP Guar com um sistema inovador que minimiza a possibilidade de embaçamento inicial através do controle do aumento de viscosidade de HP Guar após instilação do lubrificante ocular.

SYSTANE® UL Lubrificante Oftálmico contém propilenoglicol 400 e polietilenoglicol como demulcentes na solução HP Guar, agindo como agentes de viscosidade na combinação com borato, formulado no pH 7.9 para melhor se igualar ao pH do olho irritado devido ao ressecamento. A adição de sorbitol e a eliminação dos cátions divalentes do veículo de SYSTANE® UL Lubrificante Oftálmico controlam a viscosidade da solução para uma ação ocular mais efetiva. Sorbitol é um composto não iônico, biocompatível, usado como um agente regulador de tonicidade, no SYSTANE® UL Lubrificante Oftálmico compete com o HP Guar nas ligações com borato. Este sistema de ação resulta em um lubrificante ocular que proporciona uma vantagem de viscosidade otimizada e controlada no olho após sua integração com a lágrima.

PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS

Exclusivamente para uso externo.

- Não use este produto se houver alteração de cor ou se este se tornar turvo.
- Não utilize este produto se for alérgico a qualquer um dos componentes da fórmula.
- Para evitar contaminação não toque a ponta do frasco em qualquer superfície.
- Recoloque a tampa após o uso.
- Caso ocorra dor ocular, alterações na visão, vermelhidão ou irritação, ou se o desconforto ocular persistir por mais de 72 horas, interrompa o uso do produto e consulte seu oftalmologista.
- Não utilize o produto se o lacre de segurança estiver violado ou ausente.
- Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico.
- Manter fora do alcance das crianças.

MODO DE USO:

AGITE BEM ANTES DE USAR

Instilar 1 ou 2 gotas no(s) olho(s) afetado sempre que necessário.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 a 30° C).

A validade do produto de 10 ml é de 18 meses.

A validade do produto de 15 ml é de 18 meses.

A validade do produto de 1.5 ml (amostra grátis) é de 12 meses.

128C Nº 9824

2127361

Lote, fabricação e validade: vide cartucho

Reg. ANVISA nº 80153480163.

NOVARTIS BIOCÍÊNCIAS S.A.

Av. N. S. da Assunção, 736
05359-001 - São Paulo - SP
CNPJ 56.994.502/0017-05
Indústria Brasileira

Processo de esterilização usado na fabricação: Filtração

Farm. Resp. André Luis Picoli - CRF Nº 19.161

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-7077908
sac.brasil@alcon.com

www.alconlabs.com.br

© 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 Novartis